

pointues au sommet; mais ces organes varient dans leur désinence, car on en trouve de spatulés, et d'autres qui sont foliacés. La corolle, de dimension moyenne, se compose de deux ou trois rangs de pétales roses, blancs vers l'onglet; ceux du centre un peu chiffonnés. Les styles sont velus, et un peu plus saillants qu'ils ne le sont, en général, dans les autres variétés du groupe des Rosiers rouillés. Fruit globuleux, d'un rouge vif, et couronné par les divisions persistantes du calice.

OBSERVATIONS.

Cet arbuste, par la disposition et la forme de ses folioles, munies de glandes, semblerait se rapprocher du *R. Sepium*; mais ce dernier en diffère.

1° Par ses folioles inodores : celles du *R. Zabeth* répandent, au plus haut degré, l'odeur agréable de pomme de reinette particulière aux Rosiers de la série des *Rubiginosa*;

2° Par la forme des tubes des calices qui sont ovoïdes ou oblongs : les tubes sont hémisphériques dans notre variété;

3° Par la hauteur de ses tiges et les nombreux aiguillons dont elles sont armées : le *R. Zabeth* s'élève peu, et ne présente qu'un petit nombre d'aiguillons;

4° Et enfin, les styles sont presque glabres dans le *R. Sepium*, tandis qu'ils sont velus dans notre variété.

C'est M. Du Pont qui a propagé en France ce Rosier, qui était d'ailleurs très-anciennement connu, puisque, selon une tradition anglaise, il était dédié à ELISABETH, reine d'Angleterre. Voyez vol. 1, p. 94 de cet ouvrage.